



GUÍA DE CUIDADOS · MALTIPOO

Maltipoo: guía completa de cuidados, alimentación, salud y educación

El maltipoo no tiene estándar ni club: sus cuidados se deducen del maltés y del caniche. Qué come, cuánto se mueve, qué vigilar en dientes, rodillas y oídos, y qué cambia con la edad.

EN POCAS PALABRAS

Un maltipoo necesita compañía, cepillado diario del pelo y de los dientes, peluquería periódica, entre media hora y una hora de actividad repartida en el día y un peso bien vigilado. Como es un cruce sin estándar, sus cuidados y sus riesgos de salud se deducen de sus dos razas de origen: el maltés y el caniche toy o miniatura.

- No hay club ni estándar del maltipoo: lo documentado es lo que se sabe del maltés y del caniche toy o miniatura.
- Es un perro de compañía en sentido literal: lleva mal la soledad y bien el aprendizaje con premios.
- La boca es su punto débil más cotidiano: cepillado de dientes a diario y revisión dental con el veterinario.
- Rótulas, retina, cadera, hígado, tráquea y oídos son los problemas descritos en sus razas de origen.
- Ser un cruce no lo hace más sano por sí solo: cuentan las pruebas de los padres y el cuidado de cada día.

EN ESTA GUÍA

1. ¿Cómo es convivir con un maltipoo?
2. ¿Qué come un maltipoo y cuánto?
3. ¿Cuánto ejercicio y estímulo mental necesita un maltipoo?
4. ¿Cómo se cuida el pelo, los dientes, los oídos y las uñas de un maltipoo?
5. ¿Qué enfermedades son frecuentes en las razas de origen del maltipoo y cómo se detectan?
6. ¿Qué controles de salud conviene llevar al día con un maltipoo?
7. ¿Cómo se educa a un maltipoo?
8. ¿Qué cambia en cada etapa de un maltipoo: cachorro, adulto y mayor?
9. ¿Qué errores comunes conviene evitar con un maltipoo?

¿Cómo es convivir con un maltipoo?

Es convivir con un perro pequeño, despierto y muy pegado a su gente. No hay estándar que describa su carácter, pero sus dos razas de origen apuntan en la misma dirección: la [PDSA](#) describe al maltés como dulce, inteligente y afectuoso, y al caniche como juguetón, obediente y fácil de adiestrar.

Conviene decirlo desde el principio: el maltipoo es un cruce de maltés y caniche toy o miniatura, no una raza reconocida. No tiene club oficial ni estándar, y casi nada se ha estudiado en el cruce como tal. Lo que sigue se apoya en lo documentado para el maltés y el caniche, y cada maltipoo puede parecerse más a uno o a otro. Por qué no es una raza lo explica la guía sobre [si el maltipoo tiene pedigree](#).

Encaja bien con:

- Personas que pasan buena parte del día en casa o pueden llevarlo consigo.
- Apartamentos y casas pequeñas, siempre que salga a diario.
- Quien disfruta enseñar: aprende rápido y le gusta tener tareas.

Encaja peor con:

- Casas vacías toda la jornada. Es un perro de compañía y la soledad larga le pesa.
- Niños muy pequeños sin supervisión: por su tamaño, una caída o un apretón pueden lesionarlo. Las pautas están en [niños y perros](#).
- Quien no quiere cepillar ni pagar peluquería: su pelo no admite descuido.

¿Qué come un maltipoo y cuánto?

Un alimento completo y balanceado para su etapa, en raciones pequeñas y medidas. La cantidad no sale de una tabla general: depende de las calorías de cada alimento, de su peso y de su actividad. La pauta la da el veterinario, y el perro se revisa con la mano, no solo con la báscula.

Etapa	Alimento	Tomas	Qué vigilar
Cachorro	Completo para cachorros, de croqueta pequeña	Varias al día, pequeñas y a horas fijas	Que no se salte comidas y que mude bien los dientes de leche
Adulto	Completo para adultos de talla pequeña	En general dos	El peso, los premios y el sarro
Mayor	El que indique el veterinario según sus análisis	Las que mejor tolere	El apetito, la boca y la pérdida de músculo

Cuántas tomas tocan a cada edad y cuándo se pasa al alimento de adulto están en [alimentación del cachorro por edad y tamaño](#). Ese artículo explica también la hipoglucemia, la baja de azúcar a la que están expuestos los cachorros muy pequeños: por eso un cachorro de maltipoo no se deja en ayunas.

Tres cosas son propias de un perro de este tamaño:

- **El peso se descuadra con poco.** En un perro de cinco kilos, medio kilo de más ya es mucho. La escala de condición corporal de la WSAVA va de 1 a 9 y lo ideal es 4 o 5: costillas que se palpan sin apretar y cintura visible desde arriba.
- **Los premios cuentan.** El American Kennel Club recoge la regla de que no pasen del 10 % de las calorías del día. En un perro pequeño ese margen se agota con muy pocos bocados.
- **La croqueta debe caberle en la boca.** Una pieza pensada para bocas pequeñas se mastica mejor. Si deja comida, mastica de un solo lado o se le cae el alimento, revisa la boca antes de cambiar de marca.

CONSEJO

Pesa la ración con una gramera en lugar de medirla con un vaso, y descuenta de ella los premios del día. En un perro tan pequeño, unos gramos de diferencia en cada toma se notan en pocas semanas.

Lo que no debe comer nunca está en alimentos prohibidos para perros.

¿Cuánto ejercicio y estímulo mental necesita un maltipoo?

Menos de lo que su energía hace pensar y más de lo que su tamaño sugiere. La PDSA calcula hasta media hora al día para el maltés y alrededor de una hora para el caniche, sin separar tamaños. Un maltipoo adulto y sano suele quedar entre ambas cifras.

No existe una recomendación medida para el cruce, así que toma ese rango como orientación y ajústalo a tu perro. Funciona mejor repartido: dos o tres salidas cortas y un rato de juego, antes que una caminata larga. Sus patas son cortas y se cansa antes que un perro mediano, aunque no lo demuestre.

La cabeza pide tanto como el cuerpo. La PDSA describe al caniche como un perro al que le gusta correr, nadar y traer cosas, y esa herencia se nota:

- Sesiones de adiestramiento de pocos minutos, varias veces al día.
- Juegos de olfato: esconder parte de la ración por la casa o en un tapete de olfato.
- Juguetes que hay que resolver para sacar la comida.
- Paseos en los que pueda oler con calma, no solo caminar al paso de quien lo lleva.

Si vives en tierra caliente, sal temprano o al caer la tarde y repasa las señales del golpe de calor.

¿Cómo se cuida el pelo, los dientes, los oídos y las uñas de un maltipoo?

Con una rutina corta y diaria. La PDSA pide cepillado diario tanto para el maltés como para el caniche, y el cruce hereda ese pelo que crece sin parar. Pero la parte que más pesa en su salud es la boca: en un perro pequeño, los dientes necesitan cepillo todos los días.

Pelo

No repetimos aquí lo que ya está escrito: cuánto suelta y cómo cambia el manto de un cachorro a otro está en la guía sobre [si el maltipoo suelta pelo](#), y la técnica de cepillado, baño y corte en [cuidado del pelo según el tipo de manto](#). Lo esencial: cepillo hasta la piel a diario y peluquería periódica toda la vida.

Dientes

La [Universidad de Cornell](#) estima que entre el 80 y el 90 % de los perros de más de tres años tiene algún grado de enfermedad periodontal, y que es peor en las razas pequeñas. Un estudio del [Royal Veterinary College](#) situó al caniche toy entre las razas con más riesgo.

Lo que funciona, según Cornell, es cepillar una vez al día con pasta para perros, porque la placa se deposita de forma continua, y sumar la limpieza profesional bajo anestesia general cuando el veterinario la indique. Usa siempre pasta para perros, no la de personas.

Oídos y uñas

Mira los oídos cada semana. [VCA Animal Hospitals](#) incluye al caniche miniatura entre las razas predispuestas a la otitis, y señala que las orejas caídas o con pelo son más vulnerables. Un oído sano no huele ni está rojo. No apliques gotas por tu cuenta: algunos medicamentos pueden causar sordera si el tímpano está dañado.

Las uñas se cortan cuando casi tocan el piso. Un perro que pasa mucho tiempo en brazos o sobre tapetes las gasta poco.

¿Qué enfermedades son frecuentes en las razas de origen del maltipoo y cómo se detectan?

Las que comparten los perros pequeños y las propias del maltés y del caniche: luxación de rótula, enfermedad periodontal, atrofia progresiva de retina, Legg-Calvé-Perthes, derivación portosistémica, colapso de tráquea y otitis. No hay cifras de frecuencia en el maltipoo; la tabla recoge lo descrito para sus razas de origen.

Enfermedad	Señales	Cómo se detecta o se previene
Luxación de rótula	Camina unos pasos con una pata trasera en el aire y vuelve a apoyarla	Palpación de la rodilla y radiografía. Evaluación de rótulas de los dos padres
Enfermedad periodontal	Mal aliento, encías rojas, sarro, come con dificultad	Revisión de la boca en cada consulta. Cepillado diario y limpieza profesional
Dientes de leche retenidos	Doble fila de dientes pasados los seis o siete meses	El veterinario los ve en la revisión; se extraen pronto
Atrofia progresiva de retina	Tropieza o se inquieta con poca luz; ceguera nocturna	Prueba de ADN y examen de ojos del padre o la madre caniche
Legg-Calvé-Perthes	Cojera de una pata trasera que avanza poco a poco, en perros jóvenes	Radiografía de cadera. No se cría con perros afectados
Derivación portosistémica	Cachorro que crece poco, desorientación, convulsiones, vómito, bebe y orina mucho	Ácidos biliares en ayunas y después de comer; ecografía o tomografía
Colapso de tráquea	Tos seca y áspera, «de ganso», peor con la emoción o el calor	Examen, radiografía o endoscopia. Peso sano y arnés en lugar de collar
Otitis externa	Sacude la cabeza, se rasca, oído rojo o con secreción	Examen del oído y de la secreción antes de tratar

Algunos apuntes sobre esa tabla:

- **Rótula.** El [Merck Veterinary Manual](#) la describe como frecuente en perros pequeños y la clasifica en cuatro grados. Los leves se manejan sin cirugía; los moderados y graves suelen operarse.
- **Retina.** Según [VCA](#), no duele y no tiene tratamiento eficaz, por lo que solo cabe prevenirla al elegir a los padres.
- **Cadera.** La de [Legg-Calvé-Perthes](#) no es la displasia de los perros grandes: es la cabeza del fémur la que se deteriora en perros pequeños y jóvenes. VCA la considera hereditaria.
- **Hígado.** El [Colegio Americano de Cirujanos Veterinarios](#) cuenta al maltés entre las razas predispuestas a la derivación portosistémica, un vaso anómalo que hace que la sangre esquivе el hígado.
- **Tráquea.** [VCA](#) nombra al caniche toy entre los más afectados.

¿Qué pruebas se piden a los padres?

El [Poodle Club of America](#) recomienda para los caniches toy la prueba de ADN de la atrofia progresiva de retina (forma prcd), un examen anual de ojos con oftalmólogo veterinario y la evaluación de rótulas; al miniatura le añade la de cadera. Ese club también describe epilepsia y enfermedad de Von Willebrand en la raza, que no figuran entre esas pruebas.

Para el maltés no pudimos confirmar una lista oficial equivalente. Lo razonable es pedir, como mínimo, la evaluación de rótulas y un examen clínico reciente del veterinario. Cómo leer un resultado de ADN está en [pruebas genéticas en perros](#).

Y una idea que conviene matizar: ser un cruce no protege por sí solo. Un [estudio del Royal Veterinary College](#) con 9.402 perros comparó tres cruces de caniche con sus razas de origen y no halló diferencia en el 86,6 % de las comparaciones de enfermedades. El maltipoo no estaba entre ellos, pero no hay razón documentada para suponerle una ventaja.

CUÁNDO IR AL VETERINARIO

Este artículo es informativo y no reemplaza la consulta. Ve al veterinario sin esperar si tu maltipoo está apagado, tiembla o no se sostiene, si tiene convulsiones o parece desorientado, si tose de forma seca y repetida o respira con esfuerzo, si cojea más de un par de días o si deja de comer. El diagnóstico y el tratamiento son suyos.

¿Qué controles de salud conviene llevar al día con un maltipoo?

Los de cualquier perro, más tres que pesan especialmente en uno pequeño: boca, rodillas y peso. La visita anual al veterinario sigue teniendo sentido aunque no toque vacuna, porque es cuando se revisan dientes, rótulas, corazón, piel y condición corporal. El calendario concreto lo fija él.

- **Vacunas y desparasitación.** El esquema y sus refuerzos están en [vacunas y desparasitación del cachorro en Colombia](#).
- **Revisión de la muda de dientes.** [VCA](#) indica que hacia los seis o siete meses la mayoría de los cachorros tiene ya su dentadura adulta, y que los dientes de leche que no caen son más frecuentes en razas pequeñas. Pide que le miren la boca a esa edad.
- **Boca, cada año.** Que el veterinario diga si ya toca limpieza profesional.
- **Rodillas.** La palpación de rótulas forma parte del examen; menciónale cualquier «saltito» al caminar.
- **Peso.** Anótalo en cada visita y compáralo con el anterior.
- **Ojos.** Cuéntale si tropieza de noche o duda al entrar a un cuarto oscuro.
- **Esterilización.** Cuándo y por qué, en [esterilizar a tu perro](#).

A partir de la edad madura las revisiones se hacen más frecuentes; lo detalla el artículo sobre [cuidados del perro mayor](#).

¿Cómo se educa a un maltipoo?

Con premios, sesiones cortas y las mismas reglas que tendría un perro grande. La PDSA señala que el maltés responde bien al adiestramiento con recompensas y que el caniche es obediente y aprende con facilidad. El riesgo con un perro tan pequeño no es que no aprenda, sino que nadie le enseñe.

Consejos concretos:

1. **Empieza el primer día.** Nombre, llamado y lugar para hacer sus necesidades, con el método de educación básica del cachorro.
2. **Enséñale a dejarse manipular.** Patas, orejas, boca, cepillo y secador, unos segundos cada día y con premio. Va a pasar por peluquería y cepillado de dientes toda su vida.
3. **Que camine.** Llevarlo siempre en brazos le quita ejercicio, olfato y experiencias. Al piso, con arnés.
4. **Socialízalo aunque sea pequeño.** Personas, ruidos, superficies y otros perros tranquilos, como explica socialización del cachorro.
5. **Practica la soledad en dosis pequeñas.** Ausencias de minutos que crecen poco a poco, desde cachorro. Las señales de alarma están en ansiedad por separación.
6. **No premies el ladrido ni el salto.** La atención llega cuando está callado y con las cuatro patas en el piso.
7. **Descuenta los premios de la ración.** Usa trozos mínimos o parte de su propia comida.

¿Qué cambia en cada etapa de un maltipoo: cachorro, adulto y mayor?

Cambian la comida, el ritmo y lo que hay que vigilar. De cachorro mandan las tomas frecuentes, las vacunas y el aprendizaje; de adulto, el peso y los dientes; de mayor, las revisiones y la comodidad. Sobre cuánto vive no hay datos del cruce, solo de sus razas de origen.

- **Cachorro.** Come varias veces al día, no se salta tomas y aprende rutinas. Es la etapa de las vacunas, de la muda de dientes y de acostumbrarlo al cepillo. Cuánto crecerá lo trata la guía sobre el tamaño adulto del maltipoo.
- **Adulto.** Rutina estable de paseos, juego y cepillado. Es cuando el peso sube sin que se note y cuando el sarro empieza a acumularse.
- **Mayor.** Revisiones más seguidas, boca vigilada de cerca y casa adaptada: tapetes que no resbalen y una rampa para el sofá si la necesita.

Sobre la esperanza de vida, la PDSA da más de 12 años al maltés y de 12 a 14 al caniche. Un estudio británico con 584.734 perros calculó una mediana de 12,7 años para las razas pequeñas y de 12,0 para los cruces en conjunto, sin separar los cruces planeados. Para el maltipoo no existe una cifra propia: es razonable esperar más de doce años, sin que nadie pueda asegurarlo.

¿Qué errores comunes conviene evitar con un maltipoo?

Casi todos nacen de tratarlo como un juguete y no como un perro. Los más frecuentes se pueden corregir sin gastar más, solo con rutina: cepillar dientes y pelo, medir la comida, sacarlo a caminar y enseñarle a quedarse solo. Estos son los que más se repiten.

- **No cepillarle los dientes.** Es el descuido con más consecuencias en un perro pequeño.
- **Dejar que el pelo se anude** y resolverlo rapando en cada visita a la peluquería.
- **Darle premios sin contarlos** o comida de la mesa.
- **Saltarle comidas de cachorro** o dejarlo muchas horas sin comer.
- **Llevarlo siempre en brazos** y no dejar que camine ni huela.
- **Pasearlo con collar** si tose al tirar: mejor arnés, y consulta.
- **Medicar un oído o una tos por cuenta propia.**
- **Dar por hecho que no necesita educación** porque es pequeño.
- **Creer que por ser cruce no enferma** y no preguntar por las pruebas de sus padres.
- **Dejarlo solo todo el día** sin haberle enseñado antes.
- **Tomar una cojera a saltitos por una costumbre graciosa.** Es motivo de consulta.

Ninguna guía sustituye a quien examina a tu perro. La ración, el calendario de vacunas y cualquier tratamiento los decide tu veterinario.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto ejercicio necesita un maltipoo al día?

No hay una cifra para el cruce. La organización veterinaria británica PDSA habla de hasta media hora diaria para el maltés y de alrededor de una hora para el caniche. Un maltipoo adulto y sano suele quedar entre las dos, repartido en varios paseos cortos y juego.

¿Cada cuánto hay que cepillarle los dientes a un maltipoo?

A diario. La Universidad de Cornell explica que la placa se deposita sin parar y que el cepillado diario, con pasta para perros, es la base de la prevención, junto con la limpieza profesional bajo anestesia que indique el veterinario.

¿Qué enfermedades son comunes en el maltipoo?

No hay estudios propios del cruce. En sus razas de origen están descritas la luxación de rótula, la enfermedad periodontal, la atrofia progresiva de retina, la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, la derivación portosistémica del hígado, el colapso de tráquea y la otitis.

¿Cuántos años vive un maltipoo?

No existe un dato fiable para el maltipoo. La PDSA da más de 12 años al maltés y de 12 a 14 al caniche, y un estudio británico con más de 580.000 perros halló una mediana de 12,7 años en las razas pequeñas. Es razonable esperar algo parecido, sin garantía.

¿Puede un maltipoo quedarse solo en casa?

Puede aprender a quedarse solo ratos razonables si se le enseña desde cachorro, poco a poco. Es un perro criado para acompañar y no encaja en una casa vacía toda la jornada. Si destroza, ladra o se hace daño al quedarse solo, consulta al veterinario.

¿Un maltipoo es más sano por ser un cruce?

No está demostrado. Un estudio del Royal Veterinary College con tres cruces de caniche no halló diferencia con las razas de origen en el 86,6 % de las comparaciones de enfermedades. El maltipoo no formaba parte de ese estudio.

Fuentes

1. **PDSA: ficha del maltés.** En inglés. Hasta media hora de ejercicio al día, cepillado diario, carácter, esperanza de vida de más de 12 años y problemas de salud de la raza
<https://www.pdsa.org.uk/pet-help-and-advice/looking-after-your-pet/puppies-dogs/small-dogs/maltese>
2. **PDSA: ficha del caniche (poodle).** En inglés. Alrededor de una hora de ejercicio diario, cepillado diario, respuesta al adiestramiento y esperanza de vida de 12 a 14 años. No separa las cifras por tamaño
<https://www.pdsa.org.uk/pet-help-and-advice/looking-after-your-pet/puppies-dogs/large-dogs/poodle>
3. **Poodle Club of America: salud.** En inglés. Pruebas recomendadas a reproductores toy y miniatura (ADN de atrofia progresiva de retina, examen de ojos anual, rótulas; cadera en el miniatura) y enfermedades descritas en la raza
<https://poodleclubofamerica.org/health/>
4. **Merck Veterinary Manual: luxación de rótula en perros y gatos.** En inglés. Frecuencia en razas pequeñas, cojera «a saltitos», diagnóstico por palpación y radiografía, grados 1 a 4 y tratamiento
<https://www.merckvetmanual.com/musculoskeletal-system/arthropathies-and-related-disorders-in-small-animals/patellar-luxation-in-dogs-and-cats>
5. **Cornell University, Riney Canine Health Center: enfermedad periodontal.** En inglés. Entre el 80 y el 90 % de los perros de más de tres años, peor en razas pequeñas; cepillado diario y limpieza profesional bajo anestesia
<https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-information/periodontal-disease>
6. **Royal Veterinary College (VetCompass): estudio sobre enfermedad dental en perros.** En inglés. El caniche toy, entre las razas con más riesgo de enfermedad periodontal; el riesgo baja al aumentar el peso adulto. Publicado en Journal of Small Animal Practice, 2021
<https://www.rvc.ac.uk/vetcompass/news/new-rvc-research-gets-to-the-root-of-dental-disease-in-dogs>
7. **VCA Animal Hospitals: dientes de leche retenidos en perros.** En inglés. Dentadura adulta completa hacia los 6 o 7 meses; dientes persistentes más frecuentes en razas pequeñas
<https://vcahospitals.com/know-your-pet/retained-deciduous-teeth-baby-teeth-in-dogs>
8. **VCA Animal Hospitals: atrofia progresiva de retina.** En inglés. Ceguera nocturna como primera señal, sin dolor y sin tratamiento eficaz; pruebas genéticas
<https://vcahospitals.com/know-your-pet/progressive-retinal-atrophy-in-dogs>
9. **VCA Animal Hospitals: enfermedad de Legg-Calvé-Perthes.** En inglés. Perros jóvenes de razas pequeñas, entre ellas los caniches; cojera progresiva, diagnóstico por radiografía, carácter hereditario
<https://vcahospitals.com/know-your-pet/legg-calve-perthes-disease-in-dogs>
10. **American College of Veterinary Surgeons: derivaciones portosistémicas.** En inglés. El maltés entre las razas predispuestas; señales, ácidos biliares en ayunas y después de comer, ecografía y cirugía
<https://www.acvs.org/small-animal/portosystemic-shunts/>
11. **VCA Animal Hospitals: colapso de tráquea.** En inglés. El caniche toy entre las razas más afectadas; tos seca «de ganso», peso sano y arnés en lugar de collar
<https://vcahospitals.com/know-your-pet/tracheal-collapse-in-dogs>
12. **VCA Animal Hospitals: otitis externa en perros.** En inglés. Señales, predisposición del caniche miniatura y de las orejas caídas o con pelo, y por qué no se medica sin diagnóstico
<https://vcahospitals.com/know-your-pet/ear-infections-in-dogs-otitis-externa>
13. **WSAVA: escala de condición corporal del perro.** En inglés. Escala de 1 a 9; lo ideal es 4 o 5
<https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Body-Condition-Score-Dog.pdf>
14. **American Kennel Club: cuántos premios puede comer un perro.** En inglés. Los premios no deben pasar del 10 % de las calorías del día
<https://www.akc.org/expert-advice/health/how-many-treats-can-dog-have/>

15. **Bryson y otros (2024), PLOS ONE: salud de los cruces «de diseño» frente a sus razas de origen.** En inglés. 9.402 perros; cockapoo, labradoodle y cavapoo; sin diferencia en el 86,6 % de las comparaciones; más otitis que la raza de origen que no es caniche. No incluye al maltipoo
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0306350>
16. **McMillan y otros (2024), Scientific Reports: longevidad de las razas de perros de compañía.** En inglés. 584.734 perros del Reino Unido; mediana de 12,5 años en general, 12,7 en razas pequeñas, 12,7 en perros de raza y 12,0 en cruces
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10834484/>



Texto informativo. No sustituye la consulta con tu veterinario: la pauta de alimentación, vacunas y tratamientos de tu perro la da quien lo examina. La versión al día de esta guía está en casatrufa.com/blog/guia-de-cuidados-del-maltipoo.